



Intracox Oral

Naziv i adresa nosioca dozvole za lek
VOJVODINALEK DOO, Temerinski put 93 Novi Sad

Naziv i adresa proizvođača
- Interchemie werken "De Adelaar" Eesti AS, Vanapere Tee 14, Viimsi, Estonia

Ime leka
Intracox Oral
toltrazuril (25 mg/ml)
oralni rastvor
za piliće i čurke

Kvalitativni i kvantitativni sastav
1 mL oralnog rastvora za sadrži:
Aktivna supstanca:
Toltrazuril25 mg.

Pomoćne supstance:
Trietanolamin, makrogol-300

Indikacije:
Pilići:
Lečenje kokcidioze uzrokovane sojevima *Eimeria acervulina*,
E. brunetti, *E. maxima*, *E. mivati*, *E. necatrix*, *E. tenella*.
Čurke:
Lečenje kokcidioze uzrokovane sojevima *E. adenoides*,
E. meleagridis.

Kontraindikacije:
Ne daje se životinjama preosetljivim na aktivnu supstancu ili na neki ekscipijens.
Lek se ne daje kokama nosiljama konzumnih jaja.

Neželjena dejstva:
Nema poznatih.
Ako primetite bilo kakva ozbiljna neželjena dejstva ili neželjena dejstva koja nisu navedena u ovom uputstvu, obavestite o tome nadležnog veterinaru.

Ciljne vrste: Pilići i čurke.

Doziranje i način primene:
Preporučena doza je 7 mg toltrazurila po 1 kg t.m. dnevno, tokom 2 uzastopna dana, što odgovara 28 ml Intracox Oral na 100 kg t.m. dnevno, tokom dva uzastopna dana (vodu za piće treba davati 8 sati dnevno).

Ukupna telesna masa životinja	doza
10 kg	2,8 mL
50 kg	14 mL
100 kg	28 mL
250 kg	70 mL
500 kg	140 mL
1000 kg	280 mL
5000 kg	1400 mL
10000 kg	2800 mL

Da bi se obezbedilo pravilno doziranje, potrebno je što tačnije izračunati ukupnu težinu životinja koje se tretiraju, kao i dnevnu konzumaciju vode.

Terapija u trajanju od dva dana je dovoljna za lečenje kliničke ili kontrolu subkliničke kokcidioze tokom davanja jonofora.
Tretman je najefikasniji u ranoj fazi infekcije, pa je korisna rana dijagnoza. Tretman treba započeti već pri prvim znacima bolesti.

Način primene:
Intracox Oral se primenjuje dodavanjem u vodu za piće.

Uputstvo za pravilnu upotrebu leka:
Preparat se primenjuje razblažen u vodi za piće laganim mešanjem. Dnevno pripremati svež rastvor leka. U nedostatku studija inkompatibilnosti, lek u vodi za piće ne treba mešati sa drugim veterinarskim lekovima.

Karena leka:
Pilići:
Meso i jestiva tkiva: 16 dana
Čurke:
Meso i jestiva tkiva: 16 dana
Lek se ne koristi kod nosilja konzumnih jaja.

Posebna upozorenja za čuvanje leka:
Čuvati na temperaturi do 25°C. Zaštiti od svetlosti.
Ne držati u frižideru.
Rok upotrebe: 3 godine.
Uslovi čuvanja: Ne zahteva posebne uslove čuvanja.
Rok upotrebe posle otvaranja kontejnera: 3 meseca
Rok upotrebe posle rekonstitucije vode za piće za životinje: 24 časa.

Posebna upozorenja:
Za primenu na životinjama.

Posebna upozorenja za svaku ciljnu vrstu
Istovremena upotreba sa antibiotcima može dovesti do smanjenog unosa vode kod čuraka. Kao i kod drugih antikocidijalnih lekova, produžena primena može dovesti do razvoja rezistentnih sojeva.

Posebna upozorenja za osobe koje daju veterinarski lek životinjama
Intracox Oral je alkalni rastvor. Preporučuje se nošenje gumenih rukavica pri rukovanju koncentrovanim lekom.
Posle eventualnog kontakta sa rastvorom odmah isprati kožu i oči.
Ne jesti ne piti i ne pušiti pri rukovanju sa lekom.

Upotreba tokom graviditeta i laktacije
Lek se ne koristi kod koka nosilja konzumnih jaja.

Interakcije
Nisu poznate.

Predoziranje
Ako se preporučena doza prekorači, može doći do smanjenja unosa vode.

Inkompatibilnost
Nije poznata.

Posebne predostrožnosti kod odlaganja i uništavanja:
Neupotrebljen lek ili ostatak leka uništavaju se u skladu sa važećim propisima.

Datum odobrenja teksta uputstva za korisnika:
19.06.2017.

Ostali podaci:
Pakovanje:
Boca od 1 L bele boje od polietilena visoke gustine (HDPE) sa HDPE/PP čepom od polietilena i sigurnosnim diskom od aluminijumske folije.

Režim izdavanja leka: Lek se može izdavati samo na recept veterinaru.
ATCvet kod: QP51AJ01
Broj i datum izdavanja dozvole:
323-01-00283-16-001 od 19.06.2017.