



# Limoxin-200 LA

## **Naziv i adresa nosioca dozvole za LEK**

Vojvodinalek d.o.o. export import, Temerinski put 93, Novi Sad, Srbija

## **Naziv i adresu proizvođača**

- Interchemie werken "De Adelaar" Eesti AS, Vanapere Tee 14, Viimsi, Estonia

## **Ime leka**

Limoxin-200 LA

Rastvor za injekciju

Za goveda, ovce, koze, svinje, čurke i brojler

## **Kvalitativni i kvantitativni sastav**

1 mL rastvora za injekciju sadrži:

Oksitetraciklin ..... 200 mg. (u obliku oksitetraciklin, dihidrata)

## **Pomoćne supstance:**

2-pirolidon, povidon K17, natrijum formaldehidsulfosilikat dihidrat, magnijejum-oksid, teski, monoetilamin, hlorvodonična kiselina i voda za injekcije.

## **Indikacije:**

**Goveda:**

- Terapija respiratoričnih bolesti prouzrokovanih *Pasteurella multocida* i *Mannheimia haemolytica*, kada su ustanovljeni simptomi na određenom broju životinja u stadi.
- Terapija zaraznog keratokonjunktivitisa goveda prouzrokovanoj *Moraxella bovis*.

Prevencija metritisa ako se tretira tokom ili neposredno nakon partusa.

-Terapija anaplasmoze uzrokovane *Anaplasma marginale*.

-Terapija kрpeljske groznice uzrokovane sa *Babesia divergens* i *Cytoecotes phagocytophilia* kad su simptomi bolesti ustanovljeni na određenom broju životinja u stadi.

## **Svinje:**

-Terapija respiratoričnih bolesti uzrokovanih *P. multocida*, *Bordetella bronchiseptica* i *Actinobacillus pleuropneumoniae*.

-Terapija atrofičnog rinitsa kod prasića prouzrokovanoj *P. multocida* i *B. Bronchiseptica* kad su ustanovljeni simptomi kod određenog broja životinja u stadi.

-Terapija neonatalnog proliva tretiranjem krmača pre ili posle prašenja, ili tretiranjem same novorođene prasadi kad su ustanovljeni simptomi kod određenog broja životinja u stadi.

-Terapiju MMA sindroma krmača pre, tokom ili neposredno nakon prasenja kad su ustanovljeni simptomi kod određenog broja životinja u stadi.

## **Ovce:**

-Terapija enzootske pneumonije prouzrokovane *Mannheimiae haemolyticae*.

-Prevencija pobaćaja prouzrokovanih sa *Chlamydia ovis*.

Terapija i kontrola "kрpeljske groznice" prouzrokovane *Cytoecotes phagocytophilia* i *Staphylococcus aureus*.

-Terapija eksudativnog perikarditisa („heartwater“) koji je uzrokovana *Ehrlichia ruminantium*.

## **Koze:**

-Terapija CCP (Contagious Caprine Pleuropneumonia) koju prouzrokuje *Mycoplasma pneumoniae*.

## **Bojleri:**

-Terapija CRD-a (hronični respiratorični sindrom).

## **Čurke:**

- Terapiju infekcija prouzrokovanih *P. multocida*.

## **Kontraindikacije:**

Ne primenjivati kod životinja koje su preosetljive na oksitetraciklin ili na neku od pomoćnih supstanci.

Ne primenjivati kod životinja sa insuficijencijom jetre i bubrega.

## **Neželjena dejstva:**

Na mestu aplikacije može doći do lokalne reakcije (zapaljenje i iritacija).

Primena tetraciklina u periodu razvoja kostiju i zuba, uključujući pozni gravidiitet, prouzrokuje prebojavanje zuba i usporen rast kostiju kod fetusa.

Parenteralna aplikacija tetraciklina može dovesti do smanjenja plodnosti kod muških životinja.

Ukoliko primite ozbiljno ili bilo kakvo drugo neželjeno dejstvo koje ovde nije navedeno, o tome obavestite nadležnog veterinara.

## **Ciljne vrste:** Goveda, ovce, koze, svinje, čurke i brojleri.

## **Doziranje i način primene:**

**Goveda i svinje (>10 kg), ovce i koze:**

Pojedinačna doza od 20 mg oksitetraciklina/kg telesne mase (tj. 1 mL Limoxin-200 LA na 10 kg telesne mase) daje se intramuskarano. Maksimalna zapremina po injekcijonom mestu kod svinja, koza i ovaca je 5 mL a za goveda 10 mL.

## **Bojleri i čurke:**

Pojedinačna doza od 50 mg oksitetraciklina/kg telesne mase (tj. 0,25 mL Limoxin-200 LA po kg telesne mase), subuktanim načinom primene.

## **Način primene**

Subuktana upotreba i intramuskularna upotreba.

## **Uputstvo za pravilnu upotrebu leka:**

Kod goveda, ovaca, koza i svinja telesne mase veće od 10 kg, lek se ne daje subuktanom.

## **Karenca**

**Goveda, ovce, koze:**

Meso i iznutrice: 27 dana

Mleko: 13 dana.

## **Svinje:**

Meso i iznutrice: 27 dana

## **Brojleri i čurke:**

Meso i iznutrice: 27 dana

## **Posebna upozorenja za čuvanje leka:**

Čuvati na temperaturi do 25°C. Čuvati u originalnom pakovanju, radi zaštite od svjetlosti.

Ne čuvati u frižideru. Ne zamrzavati.

## **Posebna upozorenja:**

### **Za primenu na životinjama.**

Lek se primenjuje intramuskularno kod goveda, ovaca, koza i svinja (> 10 kg).

Ne primenjivati subuktanom.

Parenteralna primena tetraciklina može dovesti do smanjenja plodnosti kod muških životinja.



Interchemie werken De Adelaar Eesti AS  
Vanapere Tee 14, Viimsi, Estonia

Holland



# Limoxin-200 LA

**Upotreba tokom laktacije, graviditeta i nošenja jaja.**

Bezbednost primene leka nije dokazana tokom graviditeta laktacije i nošenja jaja. Primena tetraciklina u periodu razvoja kostiju i zuba, uključujući pozni graviditet, prouzrokuje prebojavanje zuba i usporeni rast kostiju kod fetusa.

**Posebna upozorenja za osobe koje daju veterinarski lek životinjama:**

Ne jesti, piti i pušti tokom rukovanja lekom. Posle upotrebe oprati ruke. Voditi računa da ne dođe do samoubrizgavanja. Lek može izazvati lokalnu iritaciju i/ili bol na mestu injekcije. U slučaju samoubrizgavanja, treba odmah potražiti pomoć lekara i pokazati mu uputstvo ili pakovanje.

Osobe sa poznatom preosetljivošću na oksitetraciklin trebalo bi pažljivo da rukuju ovim lekom.

Zbog mogućeg kontaktne dermatitisa, treba izbegavati direktni kontakt leka sa kožom i sluzokozom.

Nositi zaštitne rukavice.

**Predoziranje**

Oksitetraciklin ima široku granicu sigurnosti kod ciljnih vrsta i vrlo je mala verovatnoća da će predoziranjem nastati simptomi toksičnosti. Ako se posumnja na toksične reakcije usled predoziranja treba prekinuti sa terapijom i započeti odgovarajuće simptomatsko lečenje.

**Interakcije**

Ne treba primenjivati sa drugim antibioticima kao što su penicilini i cefalosporini.

**Posebne predozročnosti kod odlaganja i uništavanja:**

Neiskorišćeni lek ili otpadni materijal se uništavaju u skladu sa važećim propisima.

**Datum odobrenja teksta uputstva za korisnika:** 16.10.2017.

**Ostali podaci:**

**Pakovanje:**

Unutrašnje pakovanje: bočica od tamnog stakla (tip II), zapremine 100 mL, zatvorena bromobutil gumenim zatvaračem i aluminijumskom kapicom.

Spojašnje pakovanje: kartonska kutija sa 1 boćicom od 100mL i Uputstvom za lek.

**Režim izdavanja leka:** Lek se može izdavati samo na recept veterinaru.

**ATCvet kod:** QJ01AA06

**Broj i datum izdavanja dozvole:**

323-01-00443-15-002 od 16.10.2017.



Interchemie werken De Adelaar Eesti AS  
Vanapere Tee 14, Viimsi, Estonia

Holland