



Agencija za lekove i  
medicinska sredstva Srbije



**UPUTSTVO ZA LEK**

**INTERMECTIN injection, rastvor za injekciju, 10mg/mL, 1 x 50 mL**  
**INTERMECTIN injection, rastvor za injekciju, 10mg/mL, 1 x 100 mL**

**(za primenu na životinjama)**

Proizvođač:

1. INTERCHEMIE WERKEN DE ADELAAR
2. INTERCHEMIE WERKEN DE ADELAAR ESTI as

Adresa:

1. Metaalweg 8, 5804 CG Venray, Holandija
2. Vanapere Tee 14, Viimsi, Estonija

Podnosilac zahteva:

Vojvodinallek d.o.o.

Adresa:

Temerinski put 93, Novi Sad, Srbija

Broj rešenja:

323-01-00191-14-002 od 04.06.2015. za lek INTERMECTIN injection, rastvor za injekciju, 1 x 100 mL (10 mg/mL)  
323-01-00192-14-002 od 04.06.2015. za lek INTERMECTIN injection, rastvor za injekciju, 1 x 50 mL (10 mg/mL)

## 1. NAZIV I ADRESA NOSIOCA DOZVOLE ZA LEK

Vojvodinalek d.o.o., Temerinski put 93, Novi Sad, Srbija

## NAZIV I ADRESA PROIZVOĐAČA

1. INTERCHEMIE WERKEN DE ADELAAR, Metaalweg 8, 5804 CG Venray, Holandija
2. INTERCHEMIE WERKEN DE ADELAAR ESTI as, Vanapere Tee 14, Viimsi, Estonija

### Napomena:

Štampano Uputstvo za lek u konkretnom pakovanju leka mora jasno da označi onog proizvođača koji je odgovoran za puštanje u promet upravo te serije leka o kojoj se radi, tj. da navede samo tog proizvođača, a ostale da izostavi.

## 2. IME LEKA

INTERMECTIN injection  
ivermektin (10mg/mL)  
rastvor za injekciju  
za goveda, ovce i svinje

## 3. KVALITATIVNI I KVANTITATIVNI SASTAV

1 mL rastvora za injekciju sadrži:

### Aktivna supstanca:

ivermektin 10 mg

### Pomoćne supstance:

glicerolfomal; propilenglikol.

## 4. INDIKACIJE

Lek je namenjen za lečenje i kontrolu infekcija uzrokovanih želučano-crevnim i plućnim nematodama, kao i ektoparazitima osetljivim na ivermektin kod goveda ovaca i svinja.

Goveda:	Odrasli oblici	L3	L4	Inhibisani L4
<u>Želudačno-crevne nematode :</u>				
<i>Oestertagia lyrata</i>	○		○	
<i>Oestertagia oestertagi</i>	○		○	○
<i>Cooperia oncophora</i>	○		○	
<i>Cooperia pectinata</i>	○		○	
<i>Cooperia punctata</i>	○		○	
<i>Cooperia spp</i>	○			
<i>Haemonochus placei</i>	○	○	○	

Broj rešenja:

323-01-00191-14-002 od 04.06.2015. za lek INTERMECTIN injection, rastvor za injekciju, 1 x 100 mL (10 mg/mL)

323-01-00192-14-002 od 04.06.2015. za lek INTERMECTIN injection, rastvor za injekciju, 1 x 50 mL (10 mg/mL)

<i>Mecistocirrus digitus</i>	○			
<i>Trichostrongylus axei</i>	○		○	
<i>Trichostrongylus columbiformis</i>	○		○	
<i>Bunostomum phlebotomum</i>	○		○	
<i>Oesophagostomum radiatum</i>	○	○	○	
<i>Strongyloides papillosus</i>	○			
<i>Nematodirus helvetianus</i>	○			
<i>Nematodirus spathinger</i>	○			
<i>Trichuris spp.</i>	○			
<u>Plućne nematode:</u>				
<i>Dictyocaulus viviparus</i>	○		○	
<u>Očne nematode:</u>				
<i>Thelazia spp.</i>	○			
<i>Parafilaria bovicola</i>	○			
<u>Vaši :</u>				
<i>Linognathus vituli</i>				
<i>Haematopinus erurysternus</i>				
<i>Solenopotes capillatus</i>				
<u>Šugarci:</u>				
<i>Sarcoptes scabiei var. bovis</i>				
<i>Psoroptes ovis</i>				
<i>Chorioptes bovis</i>				
<u>Štrkalj:</u>				
<i>Hyoderma bovis</i>				
<i>Dermatobia hominis</i>				
<i>Hypoderma lineatum</i>				

### Perzistentna dejstvo

Primena leka u preporučenoj dozi od 0,2 mg/kg telesne mase, sprečiće reinfekciju životinja sledećim nematodama: *Cooperia spp.* i *Oestertagia spp.* u trajanju od najmanje 7 dana nakon tretmana; *Dictyocaulus viviparus*, u trajanju od najmanje 14 dana nakon tretmana.

Ovce :	Odrasli oblici	L3	L4	Inhibisani L4
<u>Gastrointestinalne nematode:</u>				
<i>Oestertagia circumcinata</i>	○		○	○
<i>Oestertagia trifurcata</i>				
<i>Haemonochus contortus</i>	○	○	○	○
<i>Trichostrongylus axei</i>	○			
<i>Trichostrongylus columbiformis</i>	○		○	

Broj rešenja:

323-01-00191-14-002 od 04.06.2015. za lek INTERMECTIN injection, rastvor za injekciju, 1 x 100 mL (10 mg/mL)

323-01-00192-14-002 od 04.06.2015. za lek INTERMECTIN injection, rastvor za injekciju, 1 x 50 mL (10 mg/mL)



Agencija za lekove i  
medicinska sredstva Srbije

<i>Trichostrongylus vitrinus</i>	o			
<i>Cooperia curticei</i>	o		o	
<i>Oesophagostomum columbianum</i>	o	o	o	
<i>Oesophagostomum venulosum</i>	o			
<i>Nematodirus filicollis</i>	o		o	
<i>Chabertia ovina</i>	o	o	o	
<i>Trichurius ovis</i>	o			
<i>N. spathinger</i>			o	
<i>Strongyloides papillosus</i>			o	
<i>Gaigeria pachyscelis</i>			o	
<u>Plućne nematode:</u>				
<i>Dictyocaulus filaria</i>	o	o	o	
<i>Protostrongylus rufescens</i>	o			
<u>Štrkalj:</u>				
<i>Oestrus ovis</i>				
<u>Šugarci:</u>				
<i>Sarcoptes scabiei var. ovis</i>				
<i>Psoroptes ovis</i>				
<i>Psorergates ovis</i>				

<b>Svinje :</b>	<b>Odrasli oblici</b>	<b>L4</b>
<i>Ascaris suum</i>	o	o
<i>Hyostrogylus rubidus</i>	o	o
<i>Oesophagostomum spp.</i>	o	o
<i>Strongyloides ransomi*</i>	o	
<i>Trichurius suis</i>	o	
<u>Plućne nematode:</u>		
<i>Metastrongylus spp.</i>		
<u>Vaši:</u>		
<i>Haematopinus suis</i>		
<u>Bubreg:</u>		
<i>Stephanurus dentatus</i>	o	o
<u>Šugarci:</u>		
<i>Sarcoptes scabiei var. suis</i>		
*uključuje somatski larveni stadijum		

## 5. KONTRAINDIKACIJE

Lek se ne sme aplikovati intravenski ili intramuskularno.

Ovaj lek se ne sme koristiti kod preosetljivih životinja i životinja za koje nije indikovano.

Kod nekih rasa pasa (koli, staroengleski ovčar, mešanci) može biti fatalan.

Ne daje se kravama i ovcama u laktaciji čije se mleko koristi za ishranu ljudi.

Broj rešenja:

323-01-00191-14-002 od 04.06.2015. za lek INTERMECTIN injection, rastvor za injekciju, 1 x 100 mL (10 mg/mL)

323-01-00192-14-002 od 04.06.2015. za lek INTERMECTIN injection, rastvor za injekciju, 1 x 50 mL (10 mg/mL)

