

UPUTSTVO ZA LEK

Albadry Plus, intramamarna suspenzija, injektor, 20x10 ml

(za primenu na životinjama)

Proizvođač: **Norbrook Laboratories Ltd.**
Adresa: **Station Works, Newry, County Down, Severna Irska, Velika Britanija**
Podnosilac zahteva: **Zoetis Belgium Predstavništvo Beograd**
Adresa: **Vladimira Popovića 38-40, Beograd – Novi Beograd, Srbija**



1. NAZIV I ADRESA NOSIOCA DOZVOLE ZA LEK

Zoetis Belgium Predstavništvo Beograd
Vladimira Popovića 38-40, Beograd-Novi Beograd, Srbija

NAZIV I ADRESA PROIZVOĐAČA

Norbrook Laboratories Ltd.
Station Works, Newry, County Down, Severna Irska, Velika Britanija

2. IME LEKA

Albadry Plus
Benzilpenicilin-prokain, novobiocin (200000 i.j. + 400mg)
Intramamarna suspenzija
Goveda

3. KVALITATIVNI I KVANTITATIVNI SASTAV

Aktivne supstance:

Benzilpenicilin-prokain	200000 i.j./injektor
Novobiocin-natrijum	400mg/injektor

Pomoćne supstance:

Aluminijum monostearat, ulje od kikirikija

4. INDIKACIJE

Proizvod je namenjen za lečenje mastitisa uzrokovanih sa *Staphylococcus aureus*, *Streptococcus agalactiae*, *Streptococcus dysgalactiae* i *Streptococcus uberis* kod krava u zasušenju. Namenjen je i za kontrolu letnjih mastitisa.

5. KONTRAINDIKACIJE

Ne koristiti u slučajevima preosetljivosti na aktivne sastojke.
Ne koristiti kod krava kod kojih je period zasušenja kraći od 30 dana.

6. NEŽELJENA DEJSTVA

Reakcije preosetljivosti.

7. CILJNE VRSTE ŽIVOTINJA

Goveda

8. DOZIRANJE I NAČIN PRIMENE

Aplikovati sadržaj injektora u vime. Pre upotrebe injektor treba dobro protresti. Pre aplikacije sise treba očistiti i dezinfikovati. Čitav sadržaj injektora istisnuti u jednu četvrt nakon poslednje muže na početku zasušenja.

Lek aplikovati najmanje 30 dana pre očekivanog telenja. Kod krava kod kojih je period zasušenja duži od 51 dan lečenje se može ponoviti nakon intervala od 3 nedelje. Nakon istiskivanja sadržaja u vime preporučljivo je svaku sisu ponovo dezinfikovati.

9. UPUTSTVO ZA PRAVILNU UPOTREBU LEKA

Videti tačku 8.

10. KARENCA

Mleko se ne sme koristiti za ljudsku ishranu prvih 84 sata nakon telenja kod krava sa periodom zasušenja od 30 ili više dana. Mleko krava koje su se otelile u periodu kraćem od 30 dana od ubrizgavanja mora biti ispitano da li sadrži antibiotike ili se ne sme koristiti onoliko dugo koliko je potrebno da protekne 33 dana od poslednjeg ubrizgavanja.

Meso nije za ishranu ljudi tokom tretmana. Meso goveda može se koristiti za ishranu ljudi nakon isteka 30 dana od poslednjeg tretmana.

11. POSEBNA UPOZORENJA ZA ČUVANJE LEKA

Čuvati na temperaturi do 25°C. Čuvati van domašaja dece.

Rok upotrebe: 2 godine

12. POSEBNA UPOZORENJA

Za primenu na životinjama


Upotreba tokom graviditeta i laktacije

Graviditet: nema ograničenja

Laktacija: ne koristiti tokom laktacije

Posebna upozorenja za osobe koje daju veterinarski lek životinjama

Izbegavati kontakt preparata sa kožom.



Penicilini i cefalosporini mogu izazvati preosetljivost nakon ubrizgavanja, udisanja, ingestije ili kontakta sa kožom. Preosetljivost na peniciline može izazvati unakrsnu reakciju na cefalosporine i obrnuto. Alergijske reakcije na ove supstance ponekad mogu biti ozbiljne.

Ne rukujte sa ovim preparatom ukoliko znate da ste preosetljivi ili ukoliko su vam savetovali da izbegavate rad sa takvim proizvodima.

Pažljivo rukovati proizvodom, uz primenu svih mera predostrožnosti, da bi se sprečilo izlaganje preparatu.

Ukoliko nakon izlaganja dođe do pojave simptoma kao što su kožni osip ili trajna iritacija oka, treba potražiti savet lekara. Otok lica, usana ili očiju ili otežano disanje su ozbiljni simptomi koji zahtevaju hitnu medicinsku pomoć.

13. POSEBNE PREDOSTROŽNOSTI KOD ODLAGANJA I UNIŠTAVANJA LEKA

Neiskorišćeni lek ili ostatak leka uništavaju se u skladu sa važećim propisima.

14. DATUM ODOBRENJA TEKSTA UPUTSTVA ZA KORISNIKA

14.10.2013.

15. OSTALI PODACI

Pakovanje:	20x10ml
Režim izdavanja:	Lek se može izdavati samo na recept veterinara.
ATCvet kod:	QJ51RC22
Broj dozvole:	250/2010/1400 od 29.04.2010.