

UPUTSTVO ZA LEK

Cazitel Plus, tableta, kutija sa 104 tablete

(za primenu na životinjama)

Proizvođač: **Chanelle Pharmaceuticals Manufacturing Ltd**

Adresa: **Loughrea, Co. Galway, Irska**

Podnosilac zahteva: **Zoetis Belgium Predstavništvo Beograd**

Adresa: **Vladimira Popovića 38-40, Beograd – Novi Beograd, Srbija**

1. NAZIV I ADRESA NOSIOCA DOZVOLE ZA LEK

Zoetis Belgium Predstavništvo Beograd
Vladimira Popovića 38-40, Beograd-Novi Beograd, Srbija

NAZIV I ADRESA PROIZVOĐAČA

Chanelle Pharmaceuticals Manufacturing Ltd
Loughrea, Co. Galway, Irska

2. IME LEKA

Cazitel Plus
prazikvantel, pirantel, febantel (50mg + 50mg + 150mg)/tabl.
tableta
za pse

3. KVALITATIVNI I KVANTITATIVNI SASTAV

1 tableta sadrži:

Aktivne supstance:

Prazikvantel	50 mg
Pirantel-embonat	144 mg (ekvivalentno 50 mg pirantela)
Febantel	150 mg

Pomoćne supstance:

Laktoza, monohidrat	81.75 mg
Natrijum lauril sulfat	13.00 mg
Kroskarmeloza natrijum	6.50 mg

Ostale pomoćne supstance:

Celuloza, mikrokristalna; magnezijum stearat; silicijum dioksid, kolodini, bezvodni; aroma svinjetine.

4. INDIKACIJE

Lečenje mešovitih infekcija nematodama i cestodama.

Lek je efikasan protiv sledećih vrsta parazita:

Nematode (valjkasti crvi):

Toxocara canis, *Toxascaris leonina* (odrasli oblici i razvojni oblici u kasnijim fazama razvoja)

Uncinaria stenocephala, *Ancylostoma caninum* (odrasli oblici)

Trichuris vulpis (odrasli oblici)

Cestode (pantljičare):

Echinococcus spp. (*E.granulosus*, *E.multilocularis*)

Taenia spp. (*T.hydatigena*, *T.pisiformis*, *T.taeniformis*)

Dipylidium caninum (odrasli i razvojni oblici)

5. KONTRAINDIKACIJE

Ne daje se istovremeno sa jedinjenjima piperazina.

Ne daje se životinjama sa poznatom preosetljivošću na neku od aktivnih ili pomoćnih supstanci.

6. NEŽELJENA DEJSTVA

Nisu poznata

Ukoliko primetite neko ozbiljno ili bilo koje drugo neželjeno dejstvo o tome obavestite nadležnog veterinara.

7. CILJNE VRSTE ŽIVOTINJA

Psi

8. DOZIRANJE I NAČIN PRIMENE

Lek se primenjuje peroralno.

Preporučena doza je 15 mg/kg t.m. febantela, 5mg/kg t.m. pirantela (odgovara 14,4 mg/kg t.m. pirantel embonata) i 5mg/kg t.m. prazikvantela. Ovo doza odgovara 1 tableti na 10 kg telesne mase. Tableta se daje psu direktno ili zamaskirana hranom. Nije potrebno da životinja gladije pre tretmana.

Ako postoji opasnost od reinfestacije, potrebno je tražiti savet od veterinara u pogledu učestalosti ponavljanja tretmana.

9. UPUTSTVO ZA PRAVILNU UPOTREBU LEKA

Da bi doziranje leka bilo što tačnije, telesnu masu životinje treba što tačnije odrediti.

10. KARENCA

Nije primenljivo.

11. POSEBNA UPOZORENJA ZA ČUVANJE LEKA

Čuvati van domašaja dece.

Uslovi čuvanja leka: Čuvati na temperaturi do 25 °C, u originalnom pakovanju.

Rok upotrebe: 3 godine

12. POSEBNA UPOZORENJA

Za primenu na životinjama

Buve su prelazni domaćini za *Dipylidium caninum*. Reinfestacija ovom vrstom parazita će se sigurno dogoditi ako se ne preduzmu mere kontrole prelaznih domaćina kao što su buve i miševi.

Malo je verovatna infestacija pantljičarama štenadi mlađe od 6 nedelja.

Nakon učestale i ponavljane upotrebe bilo koje klase anthelmintika može doći do razvoja rezistencije kod parazita.

Svaki preostali deo iskorišćene tablete treba baciti.

Upotreba tokom graviditeta i laktacije

Zabeleženi su teratogeni efekti kod ovaca i pacova nakon davanja visokih doza febantela. Kod pasa tokom ranog graviditeta nisu izvođena ispitivanja.

Lek treba koristiti samo u skladu sa procenom odnosa korist/rizik od strane odgovornog veterinara.

Ne preporučuje se upotreba leka kod pasa tokom prve 4 nedelje graviditeta.

Prilikom lečenja gravidnih kuja ne bi trebalo prekoračivati propisane doze.

Posebne mere predostrožnosti za osobe koje daju veterinarski lek životinjama

U slučaju gutanja leka, potražiti medicinsku pomoć i lekaru pokazati Uputstvo za lek.

Osobe koje daju tabletu psu direktno ili u hrani, posle kontakta sa lekom treba da operu ruke.

13. POSEBNE PREDOSTROŽNOSTI KOD ODLAGANJA I UNIŠTAVANJA LEKA

Neupotrebljeni lek ili ostatak leka uništavaju se u skladu sa važećim propisima.

14. DATUM ODOBRENJA TEKSTA UPUTSTVA ZA KORISNIKA

14.10.2013.

15. OSTALI PODACI

Pakovanje: Kutija sa 104 tablete

Režim izdavanja: Lek se može izdavati samo na recept veterinara.

ATCvet kod: QP52AA51

Broj i datum izdavanja dozvole: 323-01-0019-12-005 od 18.03.2013.