

UPUTSTVO ZA LEK

Linco Spectin 100, prašak za oralni rastvor, 1x150 g


(za primenu na životinjama)

Proizvođač: **Pfizer Service Company BVBA (ELC)**

Adresa: **Hoge Wei 10, Zaventem, Belgija**

Podnosilac zahteva: **Zoetis Belgium Predstavništvo Beograd**

Adresa: **Vladimira Popovića 38-40, Beograd – Novi Beograd, Srbija**



1. NAZIV I ADRESA NOSIOCA DOZVOLE ZA LEK

Zoetis Belgium Predstavništvo Beograd
Vladimira Popovića 38-40, Beograd-Noví Beograd, Srbija

NAZIV I ADRESA PROIZVOĐAČA

Pfizer Service Company BVBA (ELC)
Hoge Wei 10, Zaventem, Belgija

2. IME LEKA

Linco Spectin 100
Linkomicin, spektinomycin (222 mg/g + 444 mg/g)
Prašak za oralni rastvor
Svinje i živina

3. KVALITATIVNI I KVANTITATIVNI SASTAV

1 g praška za oralni rastvor sadrži:

Aktivne supstance:

Linkomicin-hidrochlorid (računato na linkomicin bazu)	222 mg
Spektinomycin-sulfat (računato na spektinomycin bazu)	445 mg

Pomoćne supstance:

Natrijum-benzoat	10,66 mg
Laktoza, monohidrat	do 1 g

4. INDIKACIJE

Svinje:


Za lečenje enteritisa uzrokovanog sa *Lawsonia intracellularis* (ileitis).

Živina:

Lečenje infekcija uzrokovanih bakterijama i mikoplazmama osetljivim na kombinaciju antibiotika.
Lečenje hronične respiratorne bolesti (CRD) kod tovne živine uzrokovane infekcijom mikoplazmama i koliformnim organizmima koji su osetljivi na dejstvo kombinacije antibiotika.

5. KONTRAINDIKACIJE

Preosetljivost na antibiotike u preparatu. Preparat se ne daje životinjama sa oštećenjem jetre i bubrega.



Onemogućiti pristup hrani koja sadrži linkomicin kunićima, hrčkovima, zamorcima, konjima i preživarima. Unošenje ove hrane može kod ovih životinjskih vrsta da izazove teške gastrointestinalne poremećaje.

6. NEŽELJENA DEJSTVA

Mogu da se jave prolazno razmekšavanje stolice i/ili blag otok anusa. Ovo je obično prolaznog karaktera. U retkim slučajevima može doći do blage iritacije i crvenila na koži. Ova stanja obično spontano prolaze u roku 5-8 dana bez prekidanja terapije.

7. CILJNE VRSTE ŽIVOTINJA

Svinje i živina

8. DOZIRANJE I NAČIN PRIMENE

Svinje:

Linco Spectin 100 je formulisan za primenu kroz vodu za piće. Svaki dan pripremati svež rastvor. Lečenje treba započeti odmah nakon pojave prvih simptoma bolesti. Preporučena doza je 10 mg na kg telesne mase dnevno a to se postiže primenom 63 mg kombinacije antibiotika (21 mg linkomicina +42 mg spektinomomicina) na 1 litar vode. Ova medicinirana voda mora da bude jedini izvor vode za piće za svinje tokom perioda lečenja, 7 dana.

Uputstvo za pripremu

Da bi postigli željenu dozu potrebno je rastvoriti sadržaj jedne kutije (150 g) Linco Spectin 100 u 1600 litara vode za piće.

Živina:

Linco Spectin 100 je formulisan za primenu kroz vodu kao jedini izvor vode za piće sve dok ga živina ne popije. Nakon toga, ako je potrebno, ostatak dana za piće se može dati nemedicinirana voda. Svaki dan pripremati svež rastvor.

Aplikovati 50 mg kombinacije antibiotika na kg telesne mase dnevno, na pojavu prvih znakova bolesti i nastaviti 3-7 dana.

Količina leka koja je dnevno potrebna, u gramima, je jednaka masi lečene živine pomnoženo sa 0,075. Ovu količinu zatim treba rastvoriti u vodi za piće u količini 150 g leka na 200 litara vode i dati kao jedini izvor vode za piće dok ne bude popijena. Nemediciniranu vodu treba obezbediti za ostatak dana.

U tabeli za doziranje date su količine leka koje treba rastvoriti u odgovarajućoj količini vode za piće.

Tabela za doziranje: na 1000 grla dnevno (50 mg/kg kombinacije antibiotika)

Grlo-Prosečna masa (g)	Litre medicinirane vode za piće potrebno za 1000 grla
40	4
100	10
200	20
500	50



13. POSEBNE PREDOSTROŽNOSTI KOD ODLAGANJA I UNIŠTAVANJA LEKA

Neiskorišćeni lek ili ostatak leka uništavaju se u skladu sa važećim propisima.

14. DATUM ODOBRENJA TEKSTA UPUTSTVA ZA KORISNIKA

14.10.2013.

15. OSTALI PODACI

Pakovanje:	150 g praška za oralni rastvor u kesi od polietilena, u plastičnoj kutiji
Režim izdavanja:	Lek se može izdavati samo na recept veterinara
ATCvet kod:	QJ01RA94
Broj dozvole:	532/2010/1400 od 27.09.2010.