

UPUTSTVO ZA LEK

Lincocin Forte S, intramamarni rastvor, injektor, 24x10 ml


(za primenu na životinjama)

Proizvođač: **Pfizer Manufacturing Belgium NV**

Adresa: **Rijksweg 12, B-2870 Puurs, Belgija**

Podnosilac zahteva: **Zoetis Belgium Predstavništvo Beograd**

Adresa: **Vladimira Popovića 38-40, Beograd – Novi Beograd, Srbija**



1. NAZIV I ADRESA NOSIOCA DOZVOLE ZA LEK

Zoetis Belgium Predstavništvo Beograd
Vladimira Popovića 38-40, Beograd-Noví Beograd, Srbija

NAZIV I ADRESA PROIZVOĐAČA

Pfizer Manufacturing Belgium NV
Rijksweg 12, B-2870 Puurs, Belgija

2. IME LEKA

Lincocin Forte S
Linkomicin, neomicin (330mg + 100 mg)
Intramamarni rastvor
Krave u laktaciji

3. KVALITATIVNI I KVANTITATIVNI SASTAV

Jedan injektor (10 ml intramamarnog rastvora) sadrži:

Aktivne supstance:

Linkomicin-hidrohlorid	330 mg
Neomicin-sulfat	100 mg

Pomoćne supstance:

Dinatrijum edetat, hlorovodonična kiselina, natrijum hidroksid, voda za injekcije

4. INDIKACIJE

Proizvod je namenjen za lečenje mastitisa kod krava u laktaciji. Proizvod je efikasan protiv *Staphylococcus species* (onih koji stvaraju i onih koji ne stvaraju penicilinazu), uključujući *Staphylococcus aureus*, *Streptococcus spp*, uključujući *Streptococcus agalactiae*, *Streptococcus dysgalactiae* i *Streptococcus uberis* kao i koliformnih bakterija, uključujući *Escherichia coli*.

5. KONTRAINDIKACIJE

Nisu poznate.

6. NEŽELJENA DEJSTVA

Nisu poznata.



7. CILJNE VRSTE ŽIVOTINJA

Krave u laktaciji.

8. DOZIRANJE I NAČIN PRIMENE

Sadržaj jednog injektora (10 ml proizvoda) istisnuti u svaku od obolelih četvrti kroz sisni kanal. Ponoviti ovaj tretman u razmaku od 12 sati neposredno nakon dve uzastopne muže. Za inficirane četvrti potrebno je ukupno tri tretmana.

Način primene: aseptično aplikovati u vime.

Tok lečenja treba da bude pod kontrolom veterinara.

9. UPUTSTVO ZA PRAVILNU UPOTREBU LEKA

Injektor koristiti jednom.

Pre aplikacije sisu treba očistiti i dezinfikovati. Izmusti vime u potpunosti.

a) dugo istiskivanje: ukloniti beli kraj zatvarača povlačenjem prema gore. Nežno ubaciti kanilu u sisni kanal, pažljivo istisnuti sadržaj.

b) kratko istiskivanje: ukloniti beli kraj zatvarača povlačenjem prema gore. Nežno ubaciti kanilu u sisni kanal do 1/8 dužine, pažljivo istisnuti sadržaj.

Potiskivanjem klipa raspodeliti čitav sadržaj i masažom ravnomerno ga distribuirati u mlečnoj cisterni. Nakon ubrizgavanja preporučljivo je uroniti sve sise u odgovarajuće sredstvo za potapanje.

10. KARENCA

Meso: 3 dana

Mleko: 84 sata

11. POSEBNA UPOZORENJA ZA ČUVANJE LEKA

Čuvati u originalnoj ambalaži na temperaturi do 25°C, zaštićeno od svetlosti. Ne zamrzavati. Čuvati van domašaja dece.

Rok upotrebe: 2 godine

12. POSEBNA UPOZORENJA

Za primenu na životinjama.

Posebna upozorenja za osobe koje daju veterinarski lek životinjama

Izbegavati kontakt preparata sa kožom.

Oprati ruke i izložene delove kože odmah nakon upotrebe.



13. POSEBNE PREDOSTROŽNOSTI KOD ODLAGANJA I UNIŠTAVANJA LEKA

Neiskorišćeni lek ili ostatak leka uništavaju se u skladu sa važećim propisima.

14. DATUM ODOBRENJA TEKSTA UPUTSTVA ZA KORISNIKA

14.10.2013.

15. OSTALI PODACI

Pakovanje: Injektor zapremine 10 ml od polietilena. Kartonska kutija sadrži 24 injektora.

Režim izdavanja: Lek se može izdavati samo na recept veterinara.

ATCvet kod: QJ51RF03

Broj dozvole: 259/2010/1400 od 29.04.2010.