


UPUTSTVO ZA KORISNIKA

ORBENIN EXTRA DRY COW, intramamarna suspenzija, 24x3.6g

(za primenu na životinjama)

Proizvođač: **Haupt Pharma Latina**
Adresa: **Strada Statale 156, Km 47.600, Borgo San Michele-Latina, 04100, Italija**
Podnosilac zahteva: **Zoetis Belgium Predstavništvo Beograd**
Adresa: **Vladimira Popovića 38-40, Beograd**



1. NAZIV I ADRESA NOSIOCA DOZVOLE ZA LEK

Zoetis Belgium Predstavništvo Beograd
Vladimira Popovića 38-40, Beograd

NAZIV I ADRESA PROIZVOĐAČA

Haupt Pharma Latina
Strada Statale 156, Km 47.600, Borgo San Michele-Latina, 04100, Italija

2. IME LEKA

Orbenin Extra Dry Cow
Kloksacilin 600 mg/3,6g
Intramamarna suspenzija
Za krave u zasušenju

3. KVALITATIVNI I KVANTITATIVNI SASTAV

Jedan intramamarni špric (3,6 g) sadrži:

Aktivne supstance:

Kloksacilin 600 mg
(u obliku kloksacilin –benzatina 765,4mg)

Pomoćne supstance:

Stearinska kiselina; aluminijum-stearat; parafin, tečni.

4. INDIKACIJE

Upotrebljava se kod krava za lečenje mastitisa u zasušenju i kao zaštita od infekcije vimena u periodu zasušenja.

5. KONTRAINDIKACIJE

Ne koristiti kod krava u laktaciji.

6. NEŽELJENA DEJSTVA

Nema.

7. CILJNE VRSTE ŽIVOTINJA

Krave u zasušenju

8. DOZIRANJE I NAČIN PRIMENE

Pre primene temeljno očistiti i dezinfikovati otvor sisnog kanala.



Nakon poslednje muže u laktaciji, u svaku četvrt vimena ubrizga se po jedan injektor, uz prethodno čišćenje i dezinfekciju sise. Pre aplikacije injektora voditi računa da ne dođe do kontaminacije nastavka koji ide u sisni kanal.

Posle ubrizgavanja preporučljivo je potopiti svaku od sisa u sredstvo za dezinfekciju vimena .

9. UPUTSTVO ZA PRAVILNU UPOTREBU LEKA

Videti tačku 8.

10. KARENCA

Lek nije namenjen za upotrebu kod krava sa periodom zasušenja od 42 dana ili kraćim. Mleko se može koristiti u ishrani ljudi 96 časova nakon teljenja (tj. kod devete muže krava koje se muzu dva puta dnevno). Ukoliko do teljenja dođe za manje od 42 dana od poslednje aplikacije leka, mleko se može koristiti u ishrani ljudi 42 dana + 96 sati nakon poslednje aplikacije leka. Meso lečenih krava ne sme se koristiti u ishrani ljudi tokom trajanja lečenja. Meso lečenih životinja može se koristiti u ishrani ljudi 28 dana nakon poslednje aplikacije leka.

11. POSEBNA UPOZORENJA ZA ČUVANJE LEKA

Čuvati van domašaja dece.

Čuvati na temperaturi do 25°C u originalnom pakovanju.

Rok upotrebe: 2 godine

Rok upotrebe posle prvog otvaranja: upotrebiti odmah.

12. POSEBNA UPOZORENJA

Upotreba tokom graviditeta i laktacije

Ne upotrebljavati kod krava u laktaciji.

Posebna upozorenja za osobe koje daju veterinarski lek životinjama

Penicilini i cefalosporini mogu da prouzrokuju preosetljivost (alergiju) nakon ubrizgavanja, udisanja, gutanja ili kontakta sa kožom. Preosetljivost na peniciline može dovesti i do unakrsne reakcije na cefalosporine i obrnuto. Alergijske reakcije na ove supstance mogu ponekad biti ozbiljne.

Osobe koje su osetljive na peniciline, ukoliko im je to savetovano, ne treba da rukuju sa ovakvim preparatima.

Da bi se izbegao kontakt sa ovim lekovima rukovati oprezno.

Ako se nakon kontakta pojave simptomi kao što su osip po koži trebalo bi potražiti savet lekara i pokazati mu ovo upozorenje. Otok lica, usana ili očiju ili otežano disanje su ozbiljniji simptomi koji zahtevaju hitnu medicinsku pomoć.

Nakon upotrebe oprati ruke.

13. POSEBNE PREDOSTROŽNOSTI KOD ODLAGANJA I UNIŠTAVANJA LEKA

Neiskorišćen lek ili ostatak leka uništavaju se u skladu sa važećim propisima.

14. DATUM ODOBRENJA TEKSTA UPUTSTVA ZA KORISNIKA

09.10.2014.

15. OSTALI PODACI

Unutrašnje pakovanje:

Intramamamarni špric od polietilena sa 3,6 g intramamarne suspenzije, zatvoren klipom i zaštitnom kapicom od polietilena.

Spoljašnje pakovanje:

Kutija u kojoj se nalazi 24 intramamarna šprica i 24 vlažne maramice.

Način izdavanja: Lek se može izdavati samo na recept veterinara.

ATCvet kod: QJ51CF02

Broj dozvole: 323-01-00045-14-001 od 09.10.2014.