

UPUTSTVO ZA LEK

Rimadyl Palatable Tablets, tableta za žvakanje, 100 mg, 1x30 kom

(za primenu na životinjama)

Proizvođač: **Zoetis Inc.**

Adresa: **601 West Cornhusker Highway, Lincoln, Nebraska 68521, SAD**

Podnosilac zahteva: **Zoetis Belgium Predstavništvo Beograd**

Adresa: **Vladimira Popovića 38-40, Beograd – Novi Beograd, Srbija**



1. NAZIV I ADRESA NOSIOCA DOZVOLE ZA LEK

Zoetis Belgium Predstavništvo Beograd
Vladimira Popovića 38-40, Beograd-Noví Beograd, Srbija

NAZIV I ADRESA PROIZVOĐAČA

Zoetis Inc.
601 West Cornhusker Highway, Lincoln, Nebraska 68521, SAD

2. IME LEKA

Rimadyl Palatable Tablets

karprofen 100 mg
tableta za žvakanje
za pse

3. KVALITATIVNI I KVANTITATIVNI SASTAV

1 tableta za žvakanje sadrži:

Aktivne supstance:

Karprofen 100 mg

Pomoćne supstance:

Hidrolizovani biljni proteini; laktoza, monohidrat; kukuruzni skrob; šećer, konzumni; pšenične klice; kalcijum-hidrogenfosfat, bezvodni; kukuruzni sirup; sprasena svinjska jetra; želatin, tip A; magnezijum-stearat.

4. INDIKACIJE

- Za smanjenje bola i hroničnog zapaljenja, na primer kod degenerativog oboljenja zglobova.
- Rimadyl Palatable tablete za žvakanje mogu se koristiti za smanjenje postoperativnog bola.

5. KONTRAINDIKACIJE

- Ne prekoračiti propisanu terapijsku dozu.
- Vreme eliminacije NSAIL-ova uključujući i karprofen, kod mačaka je duže nego kod pasa i terapijski indeks je uži. U nedostatku specifičnih podataka upotreba Rimadyl Palatable tableta za žvakanje kod mačaka je kontraindikovano.
- Ne upotrebljavati lek kod pasa sa oboljenjima srca, bubrega i jetre kao i oboljenjima gastrointestinalnog trakta, u slučaju opasnosti od nastajanja gastro-intestinalnih ulceracija ili krvarenja ili kada je dokazan poremećaj u sastavu krvi ili preosetljivost na proizvod. Kao i kod ostalih NSAIL-ova postoji rizik od nastanka alergijske reakcije u slučaju hepatitisa.

6. NEŽELJENA DEJSTVA

Lek retko uzrokuje neželjene reakcije u gastro-intestinalnom traktu čak i kada se primene doze više od terapijskih.

Ukoliko primetite neko neželjeno dejstvo, koje nije navedeno u ovom uputstvu, o tome obavestite nadležnog veterinara.

7. CILJNE VRSTE ŽIVOTINJA

Psi stariji od 6 nedelja.

8. DOZIRANJE I NAČIN PRIMENE

Za oralnu upotrebu.

Preporučuje se da se početna dnevna doza **2 - 4 mg karprofena na 1kg t.m.** aplikuje kao pojedinačna doza ili podeli na dve jednake doze.

U zavisnosti od kliničkog odgovora, doza se može smanjiti posle 7 dana na 2 mg karprofena na 1kg t.m. dnevno, koja se aplikuje jednom dnevno.

9. UPUTSTVO ZA PRAVILNU UPOTREBU LEKA

Rimadyl Palatables tablete za žvakanje su ukusne i psi ih rado konzumiraju.

Dužina terapije zavisi od postignutog efekta.

Duža upotreba leka trebala bi biti pod redovnim nadzorom veterinara.

10. KARENCA

Nije primenjivo.

11. POSEBNA UPOZORENJA ZA ČUVANJE LEKA

Čuvati van domašaja dece.

Uslovi čuvanja leka: Čuvati na temperaturi do 25 °C, na suvom mestu, zaštićeno od svetlosti.

Proizvod treba čuvati na sigurnom mestu. Ukoliko životinja pojede veću količinu tableta mogu se javiti ozbiljne neželjene reakcije. Ako posumnjate da je vaš pas ili mačka pojela više tableta od doze koja je propisana pozovite svog veterinara.

Rok upotrebe: 3 godine.

12. POSEBNA UPOZORENJA

Za primenu na životinjama

Upotreba leka kod pasa mladih od 6 nedelja ili kod starih pasa može predstavljati dodatni rizik. Ukoliko je primena leka kod ovih životinja neophodna, potrebno je primeniti manju dozu leka uz pojačan nadzor.

Izbegavati primenu leka kod dehidriranih, hipovolemičnih životinja ili životinja sa hipotenzijom, jer postoji rizik pojačane nefrotoksičnosti.

NSAIL mogu prouzrokovati inhibiciju fagocitoze i iz tog razloga inflamatorna stanja udružena sa bakterijskim infekcijama moraju se tretirati i odgovarajućim antibioticima.

Upotreba tokom graviditeta i laktacije

Ne primenjuje se kod kuja u graviditetu.

Posebne mere predostrožnosti za osobe koje daju veterinarski lek životinjama

Ako dođe do slučajnog gutanja tablete, potražite medicinsku pomoć i lekaru pokažite Uputstvo za lek. Oprati ruke posle svakog kontakta sa preparatom.

13. POSEBNE PREDOSTROŽNOSTI KOD ODLAGANJA I UNIŠTAVANJA LEKA

Neupotrebljeni lek ili ostali otpadni materijal se uništavaju u skladu sa važećim propisima.

14. DATUM ODOBRENJA TEKSTA UPUTSTVA ZA KORISNIKA

Maj 2014.

15. OSTALI PODACI

Pakovanje: 30 tableta

Režim izdavanja: Lek se može izdavati samo na recept veterinara.

ATCvet kod: QM01AE91

Broj i datum izdavanja dozvole: 323-01-0106-12-001 od 22.04.2013.