

UPUTSTVO ZA LEK

Vanguard Plus 5/L, liofilizat i rastvarač za suspenziju za injekciju, ukupno 25 doza, bočica sa praškom i bočica sa rastvaračem, 25x1 doza


(za primenu na životinjama)

Proizvođač: **Zoetis Inc.**

Adresa: **601 West Cornhusker Highway, Lincoln, Nebraska 68521, SAD**

Podnosilac zahteva: **Zoetis Belgium Predstavništvo Beograd**

Adresa: **Vladimira Popovića 38-40, Beograd – Novi Beograd, Srbija**



1. NAZIV I ADRESA NOSIOCA DOZVOLE ZA LEK

Zoetis Belgium Predstavništvo Beograd
Vladimira Popovića 38-40, Beograd-Novi Beograd, Srbija

NAZIV I ADRESA PROIZVOĐAČA

Zoetis Inc.
601 West Cornhusker Highway, Lincoln, Nebraska 68521, SAD

2. IME LEKA

Vanguard Plus 5/L

Vakcina koja sadrži živi virus štenecćaka (N-CDVsoj) živi Adenovirus pasa tip 2 (Manhattan soj), živi virus parainfluence pasa (NL-CPI-5 soj), živi Parvovirus pasa (NL-35-D soj) i inaktivisane bakterije *Leptospira* spp.

Liofilizat i rastvarač za suspenziju za injekciju

3. KVALITATIVNI I KVANTITATIVNI SASTAV

Jedna doza (2ml) sadrži:

Aktivne supstance:

Liofilizovana frakcija: Vanguard Plus 5

Živi atenuirani virus štenecćaka, soj N-CDV, minimalni titar: $10^{2.5}$ TCID₅₀.

Živi atenuirani pseći adenovirus tip 2 (CAV-2), soj Manhattan, minimalni titar $10^{2.9}$ TCID₅₀.

Živi atenuirani virus pseće parainfluence, soj NL-CPI-5, minimalni titar 10^5 TCID₅₀.

Živi atenuirani pseći parvovirus, soj CPV "NL-35-D", minimalni titar 10^7 TCID₅₀.

Tečna frakcija: Leptoferm C-I

Inaktivisana *Leptospira canicola*, soj C-51, minimalni titar : najmanje 80 zaštitnih doza za hrčka.

Inaktivisana *Leptospira icterohaemorrhagiae*, soj NADL (11403), minimalni titar : najmanje 80 zaštitnih doza za hrčka.

Pomoćne supstance:

Konzervans :

Gentamicin

ili

penicilin i streptomycin

4. INDIKACIJE

Vakcinacija zdrave štenadi i odraslih pasa protiv štenećaka, adenoviroze pasa, parainfluence pasa, parvovirusnog enteritisa pasa i leptospiroze pasa.

5. KONTRAINDIKACIJE

Ne vakcinisati životinje u inkubacionom periodu nekog infektivnog oboljenja, ukoliko su pothranjene ili inficirane parazitima, ukoliko su izložene stresu usled transporta ili faktora sredine. Ovaj proizvod je efikasan na zdravim životinjama.

6. NEŽELJENA DEJSTVA

Neželjene dejstva se izuzetno retko javljaju i nije potreban nikakav specifični tretman. Mogu da se jave alergijske reakcije kod vakcinisanih pasa koje se tretiraju davanjem adrenalina..

7. CILJNE VRSTE ŽIVOTINJA

Psi nakon 6 nedelja starosti

8. DOZIRANJE I NAČIN PRIMENE

Na aseptičan način rekonstituisati liofilizovanu frakciju (Vanguard Plus 5) priloženim tečnim bakterinom (Leptoferm C-I), dobro promućkati i aplikovati 1 ml rekonstituisane vakcine subkutano ili intramuskularno.

Program vakcinacije:

Primarna vakcinacija: zdravi psi stari 6 ili više nedelja primaju tri doze, razmak između svake aplikacije je tri nedelje.

Revakcinacija: preporučuje se godišnja revakcinacija jednom dozom.

9. UPUTSTVO ZA PRAVILNU UPOTREBU LEKA

Videti tačku 8.

10. KARENCA

Nula dana. (Nema karence).

11. POSEBNA UPOZORENJA ZA ČUVANJE LEKA

Čuvati van domašaja dece.

Broj rešenja: 323-01-0102-12-001 od 12.12.2012. za lek Vanguard Plus 5/L, liofilizat i rastvarač za suspenziju za injekciju ukupno 25 doza, bočica sa praškom i bočica sa rastvaračem, 25x1 doza